

cod	Specie	tipologia di allevamento	categoria	tipologia struttura di allevamento	Peso Vivo medio (Kg / capo)	Peso Vivo medio (t / capo)	liquame (m³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile (m³ /t p.v. x anno)
<b>A AVICOLI</b>								
<b>A_A_1 ovaiole o pollastre</b>								
<b>A_A_1.a</b>				- in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa profonda (durata ciclo: 10 - 12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre)	1,8 - 2,0 - 0,8 <sup>(1)</sup>	0,0018 - 0,002 - 0,0008 <sup>(1)</sup>	0,15	39,50
<b>A_A_1.b</b>				- in batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8 - 2,0 - 0,8 <sup>(1)</sup>	0,0018 - 0,002 - 0,0008 <sup>(1)</sup>	27,00	
<b>A_A_1.c</b>				- ovaiole a terra (durata ciclo: 10 -12 mesi)	1,8 - 2,0 <sup>(1)</sup>	0,0018 - 0,002 - 0,0008 <sup>(1)</sup>	0,15	18,50
<b>A_A_1.d</b>				- pollastre a terra (durata ciclo: 4 mesi)	0,8	0,0008	1,20	27,70
<b>A_A_1.e</b>				- polli da carne a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 2 mesi)	1	0,001	2,00	18,50
<b>A_A_1.f</b>				- faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi)	0,8	0,0008		
<b>A_A_1.g</b>				- tacchini a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 0-5 mesi il maschio; 0-4 mesi la femmina)	7,5 - 5,0 <sup>(2)</sup>	0,0075 - 0,005 <sup>(2)</sup>	0,90	26,50
<b>C CUNICOLI</b>								
<b>C_C_1.a</b>				- cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni(durata ciclo: 4 mesi)	1,2 - 3,5 <sup>(3)</sup>	0,0035		4,40
<b>C_C_1.b</b>				- cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi)	1,2 - 3,5 <sup>(3)</sup>	0,0035	14,60	
<b>O OVINI - CAPRINI</b>								
<b>O_O_1.a</b>				- ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15 - 35 - 50 <sup>(4)</sup>	0,015 - 0,035 - 0,05 <sup>(4)</sup>	7,00	24,40
<b>O_O_1.b</b>				- ovini e caprini su grigliato o fessurato	15 - 35 - 50 <sup>(4)</sup>	0,015 - 0,035 - 0,05 <sup>(4)</sup>	16,00	
<b>E EQUINI</b>								
<b>E_E_1.a</b>				- equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170 - 550 <sup>(5)</sup>	0,17 - 0,55 <sup>(5)</sup>	5,00	24,40
<b>E_E_1.a</b>				- equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170 - 550 <sup>(5)</sup>	0,17 - 0,55 <sup>(5)</sup>	5,00	24,40
<b>ALTRE SPECIE</b> fare riferimento a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore in accordo con la Provincia competente per territorio.								
<b>Note:</b> (1) - il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre (2) - il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina (3) - il 1° valore è riferito al coniglio da carne (0 - 4 mesi) ; il 2° valore al coniglio riproduttore (4) - il 1° valore è riferito all'agnello (0 - 3 mesi) ; il 2° valore all'agnellone (3 - 7 mesi); il 3° valore a pecora o capra; (5) - il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici;								