

cod	Specie	tipologia di allevamento	categoria	tipologia struttura di allevamento	Peso Vivo medio (Kg / capo)	Peso Vivo medio (t / capo)	liquame (m³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile (m³ /t p.v. x anno)
A	AVICOLI							
A_A_1	ovaiole o pollastre							
A_A_1.a				- in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa profonda (durata ciclo: 10 - 12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre)	0,8	0,0008	0,15	39,50
A_A_1.b				- in batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,8	0,0008	27,00	
A_A_1.c				- ovaiole a terra (durata ciclo: 10 -12 mesi)	1,8	0,0018	0,15	18,50
A_A_1.d				- pollastre a terra (durata ciclo: 4 mesi)	0,8	0,0008	1,20	27,70
A_A_1.e				- polli da carne a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 2 mesi)	1	0,001	2,00	18,50
A_A_1.f				- faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi)	0,8	0,0008		
A_A_1.g				- tacchini a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 0-5 mesi il maschio; 0-4 mesi la femmina)	5	0,005	0,90	26,50
C	CUNICOLI							
C_C_1.a				- cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni(durata ciclo: 4 mesi)	1,2	0,0012		4,40
C_C_1.b				- cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi)	1,2	0,0012	14,60	
O	OVINI - CAPRINI							
O_O_1.a				- ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15	0,015	7,00	24,40
O_O_1.b				- ovini e caprini su grigliato o fessurato	15	0,015	16,00	
E	EQUINI							
E_E_1.a				- equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170	0,17	5,00	24,40
				- equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170	0,17	5,00	24,40
ALTRE SPECIE fare riferimento a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore in accordo con la Provincia competente per territorio.								