

Tabella 1.9.5.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	20 725 627	14.3	254.1	1 413 874	11.1	17.3	11 236 223	12.9	137.8	189 588	12.5	2.3	6 088 950	12.6	74.6
abete rosso	2 253 004	47.6	27.6	120 306	48.5	1.5	992 554	57.5	12.2	15 248	45.7	0.2	496 254	56.8	6.1
cembro	2 628 934	37.3	32.2	109 164	44.1	1.3	710 095	45.2	8.7	10 791	46.1	0.1	343 915	45.0	4.2
faggio	1 628 592	70.2	20.0	42 808	72.7	0.5	404 467	76.7	5.0	5 602	68.7	0.1	321 081	76.7	3.9
abete bianco	1 653 086	79.9	20.3	34 175	59.8	0.4	248 591	53.5	3.0	5 952	66.1	0.1	139 470	54.9	1.7
pino silvestre	247 720	100.0	3.0	14 601	100.0	0.2	101 205	100.0	1.2	3 210	100.0	0.0	56 393	100.0	0.7
betulla	1 428 258	49.4	17.5	17 248	48.9	0.2	96 254	50.3	1.2	1 840	52.1	0.0	66 042	49.3	0.8
pioppo tremulo	650 264	100.0	8.0	14 210	100.0	0.2	82 494	100.0	1.0	2 617	100.0	0.0	54 512	100.0	0.7
acero di monte	574 787	60.5	7.0	4 377	44.6	0.1	25 766	44.8	0.3	394	46.3	0.0	21 343	44.6	0.3
salicone	211 281	62.0	2.6	2 995	70.4	0.0	16 658	71.3	0.2	221	63.3	0.0	11 202	69.4	0.1
frassino maggiore	123 860	60.4	1.5	1 695	62.8	0.0	13 516	65.1	0.2	142	61.2	0.0	11 670	64.9	0.1
castagno	30 965	100.0	0.4	832	100.0	0.0	7 148	100.0	0.1	109	100.0	0.0	4 465	100.0	0.1
rovere	61 930	100.0	0.8	1 188	100.0	0.0	6 542	100.0	0.1	209	100.0	0.0	5 318	100.0	0.1
altre specie	5 707 226	56.8	70.0	32 881	36.9	0.4	142 481	37.9	1.7	3 114	33.8	0.0	112 622	35.5	1.4
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	37 925 531	14.9	465.0	1 810 352	10.1	22.2	14 083 993	11.8	172.7	239 035	11.9	2.9	7 733 238	11.7	94.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	11 642 980	18.4	261.5	700 172	13.1	15.7	5 644 155	14.0	126.8	97 051	15.4	2.2	3 084 602	14.0	69.3
betulla	3 958 754	79.1	88.9	92 949	71.2	2.1	572 734	70.0	12.9	10 040	74.3	0.2	339 383	70.8	7.6
abete rosso	3 346 012	55.7	75.1	64 180	47.1	1.4	569 475	53.0	12.8	11 578	54.6	0.3	285 351	52.8	6.4
pino silvestre	253 741	71.8	5.7	23 870	74.7	0.5	164 042	69.0	3.7	3 147	71.8	0.1	91 249	69.8	2.0
acero di monte	158 588	100.0	3.6	5 061	100.0	0.1	37 550	100.0	0.8	1 795	100.0	0.0	27 534	100.0	0.6
roverella	95 153	100.0	2.1	3 443	100.0	0.1	29 718	100.0	0.7	233	100.0	0.0	24 255	100.0	0.5
salicone	190 306	84.4	4.3	3 290	92.5	0.1	21 071	94.0	0.5	979	97.2	0.0	13 376	92.9	0.3
nocciolo	63 435	100.0	1.4	660	100.0	0.0	2 840	100.0	0.1	21	100.0	0.0	2 417	100.0	0.1
altre specie	1 191 393	42.8	26.8	39 713	43.1	0.9	296 261	47.0	6.7	4 040	50.4	0.1	152 697	45.7	3.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	20 900 361	21.1	469.4	933 338	11.8	21.0	7 337 845	13.4	164.8	128 883	15.1	2.9	4 020 865	12.9	90.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	19 442 243	19.4	407.8	897 853	14.2	18.8	7 630 913	15.7	160.1	132 393	14.5	2.8	4 196 831	15.2	88.0
abete rosso	5 669 654	35.9	118.9	152 316	30.3	3.2	1 327 201	32.6	27.8	24 792	30.4	0.5	673 158	32.4	14.1
cembro	1 585 280	64.8	33.2	55 174	71.9	1.2	449 499	78.7	9.4	4 353	62.1	0.1	217 289	78.4	4.6
abete bianco	2 067 756	68.3	43.4	46 105	76.5	1.0	410 815	80.4	8.6	2 752	70.1	0.1	220 748	79.4	4.6
pino silvestre	355 743	50.7	7.5	19 047	62.5	0.4	183 121	68.9	3.8	4 712	61.5	0.1	101 940	68.8	2.1
betulla	1 300 685	63.6	27.3	22 102	72.7	0.5	142 592	78.7	3.0	2 112	73.1	0.0	91 457	74.6	1.9
ontano nero	3 417 356	100.0	71.7	9 693	100.0	0.2	24 161	100.0	0.5	579	100.0	0.0	14 853	100.0	0.3
salicene	929 379	82.5	19.5	5 620	70.8	0.1	22 399	69.6	0.5	547	69.6	0.0	21 716	72.0	0.5
faggio	177 872	81.8	3.7	2 925	86.9	0.1	22 059	88.7	0.5	548	93.8	0.0	17 600	88.6	0.4
nocciolo	751 507	100.0	15.8	1 476	100.0	0.0	6 717	100.0	0.1	88	100.0	0.0	3 592	100.0	0.1
frassino maggiore	375 754	100.0	7.9	738	100.0	0.0	4 366	100.0	0.1	57	100.0	0.0	4 536	100.0	0.1
roverella	35 574	100.0	0.7	437	100.0	0.0	1 801	100.0	0.0	24	100.0	0.0	1 738	100.0	0.0
acero di monte	35 574	100.0	0.7	252	100.0	0.0	1 378	100.0	0.0	27	100.0	0.0	1 167	100.0	0.0
altre specie	5 083 428	58.0	106.6	36 456	75.6	0.8	147 694	81.0	3.1	3 239	88.6	0.1	103 469	64.3	2.2
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	41 227 804	16.6	864.7	1 250 192	14.2	26.2	10 374 715	16.3	217.6	176 222	14.9	3.7	5 670 094	15.6	118.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	19 874 018	13.4	216.7	1 439 745	12.7	15.7	13 371 412	15.1	145.8	201 096	13.0	2.2	7 081 997	14.6	77.2
cembro	11 884 394	21.7	129.6	629 130	21.9	6.9	4 918 324	22.7	53.6	61 488	23.5	0.7	2 369 139	22.6	25.8
abete rosso	13 160 553	24.6	143.5	449 030	18.8	4.9	3 946 004	19.4	43.0	53 107	18.4	0.6	1 996 698	19.4	21.8
pino silvestre	1 325 064	66.1	14.5	47 829	44.2	0.5	420 557	42.1	4.6	10 589	58.0	0.1	234 660	42.1	2.6
castagno	3 381 379	78.2	36.9	35 833	70.9	0.4	277 745	73.1	3.0	8 607	77.8	0.1	178 204	72.5	1.9
roverella	197 350	73.8	2.2	5 228	80.8	0.1	27 574	76.6	0.3	355	60.3	0.0	24 258	76.9	0.3
betulla	338 314	69.2	3.7	4 627	64.0	0.1	26 583	64.7	0.3	531	68.2	0.0	18 686	64.6	0.2
altre specie	921 554	73.2	10.1	2 560	70.5	0.0	7 998	79.4	0.1	108	71.1	0.0	12 212	71.3	0.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	51 082 625	13.2	557.1	2 613 982	9.8	28.5	22 996 196	11.2	250.8	335 879	11.1	3.7	11 915 855	11.0	130.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	9 585 446	21.9	152.1	728 313	15.9	11.6	6 552 475	17.7	103.9	111 054	13.4	1.8	3 473 113	17.2	55.1
abete rosso	10 408 919	26.3	165.1	354 696	19.8	5.6	3 413 889	23.7	54.2	59 678	20.5	0.9	1 719 416	23.5	27.3
cembro	2 614 813	43.5	41.5	176 156	54.9	2.8	1 341 929	59.8	21.3	19 009	47.0	0.3	645 346	59.6	10.2
faggio	2 671 370	49.9	42.4	75 329	48.8	1.2	687 311	49.3	10.9	10 113	59.4	0.2	545 517	49.3	8.7
nocciolo	9 661 802	100.0	153.3	41 260	100.0	0.7	173 611	100.0	2.8	7 096	100.0	0.1	143 821	100.0	2.3
pino silvestre	180 982	73.9	2.9	18 161	75.9	0.3	124 557	71.5	2.0	2 298	80.5	0.0	69 273	71.5	1.1
abete bianco	1 757 034	61.0	27.9	15 242	70.5	0.2	108 909	76.5	1.7	2 159	90.3	0.0	63 454	74.3	1.0
salicone	90 491	100.0	1.4	3 873	100.0	0.1	35 031	100.0	0.6	1 432	100.0	0.0	19 910	100.0	0.3
orniello	241 309	100.0	3.8	3 584	100.0	0.1	23 244	100.0	0.4	950	100.0	0.0	20 135	100.0	0.3
betulla	205 773	66.1	3.3	3 243	71.4	0.1	16 482	74.5	0.3	928	68.8	0.0	11 633	71.5	0.2
roverella	30 163	100.0	0.5	811	100.0	0.0	6 284	100.0	0.1	257	100.0	0.0	5 256	100.0	0.1
carpino nero	60 327	100.0	1.0	726	100.0	0.0	4 744	100.0	0.1	49	100.0	0.0	3 952	100.0	0.1
ciliegio selvatico	30 163	100.0	0.5	607	100.0	0.0	2 868	100.0	0.0	53	100.0	0.0	2 141	100.0	0.0
altre specie	20 210 794	40.4	320.6	80 879	37.8	1.3	288 204	36.2	4.6	11 377	50.3	0.2	262 493	36.5	4.2
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	57 749 386	22.9	916.1	1 502 880	12.1	23.8	12 779 537	14.3	202.7	226 452	11.8	3.6	6 985 458	13.7	110.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	9 192 822	14.1	224.9	570 294	16.5	14.0	5 277 802	18.9	129.1	95 439	20.4	2.3	2 841 100	18.3	69.5
abete rosso	7 159 784	31.1	175.2	186 316	30.8	4.6	1 611 790	30.7	39.4	24 711	33.7	0.6	819 581	30.8	20.1
faggio	3 168 526	84.2	77.5	26 820	65.6	0.7	186 591	66.3	4.6	2 436	75.8	0.1	150 541	66.2	3.7
abete bianco	181 318	64.5	4.4	6 942	74.1	0.2	53 387	74.8	1.3	776	71.9	0.0	28 808	74.2	0.7
pino silvestre	108 791	73.2	2.7	3 105	77.0	0.1	23 603	78.5	0.6	448	78.9	0.0	13 207	78.4	0.3
ciliegio selvatico	145 054	100.0	3.5	3 147	100.0	0.1	20 181	100.0	0.5	414	100.0	0.0	12 859	100.0	0.3
carpino nero	564 351	100.0	13.8	3 691	100.0	0.1	18 440	100.0	0.5	283	100.0	0.0	16 818	100.0	0.4
nocciolo	36 264	100.0	0.9	257	100.0	0.0	1 084	100.0	0.0	22	100.0	0.0	957	100.0	0.0
altre specie	34 903 646	49.3	853.9	111 826	50.2	2.7	359 219	53.1	8.8	13 265	53.4	0.3	278 743	46.1	6.8
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	55 460 555	31.2	1 356.8	912 399	13.8	22.3	7 552 097	16.4	184.8	137 793	15.9	3.4	4 162 613	15.5	101.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	3 202 096	24.9	269.3	112 738	25.6	9.5	911 939	30.4	76.7	19 575	24.3	1.6	507 147	28.7	42.6
abete rosso	1 945 422	42.2	163.6	44 112	39.4	3.7	355 520	44.3	29.9	8 011	37.6	0.7	180 814	43.7	15.2
faggio	2 063 774	49.1	173.6	34 025	48.0	2.9	297 683	55.8	25.0	5 641	46.7	0.5	237 132	55.5	19.9
pino silvestre	289 307	100.0	24.3	6 530	100.0	0.5	33 362	100.0	2.8	742	100.0	0.1	16 539	100.0	1.4
abete bianco	39 451	73.6	3.3	2 068	70.5	0.2	19 357	69.9	1.6	419	76.4	0.0	10 066	69.9	0.8
salicene	165 201	85.1	13.9	535	69.7	0.0	1 316	75.0	0.1	75	89.7	0.0	2 416	74.4	0.2
altre specie	1 997 201	91.7	168.0	7 509	86.6	0.6	32 573	86.2	2.7	1 350	93.1	0.1	25 808	85.5	2.2
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	9 702 451	27.8	815.9	207 517	27.7	17.5	1 651 750	33.2	138.9	35 813	26.1	3.0	979 922	32.9	82.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	271 166	69.0	246.7	13 395	62.0	12.2	94 700	59.0	86.2	1 809	57.0	1.6	52 882	59.0	48.1
abete bianco	123 374	94.0	112.3	3 496	94.0	3.2	25 640	95.0	23.3	425	93.0	0.4	14 125	95.0	12.9
pino silvestre	47 978	65.0	43.7	2 414	64.0	2.2	16 964	73.0	15.4	301	69.0	0.3	9 335	73.0	8.5
faggio	6 854	100.0	6.2	422	100.0	0.4	4 365	100.0	4.0	85	100.0	0.1	3 454	100.0	3.1
salicone	237 752	100.0	216.3	951	100.0	0.9	3 302	100.0	3.0	53	100.0	0.0	4 240	100.0	3.9
acero di monte	79 250	100.0	72.1	327	100.0	0.3	1 605	100.0	1.5	31	100.0	0.0	1 557	100.0	1.4
altre specie	382 545	72.0	348.1	1 873	77.0	1.7	8 274	77.0	7.5	141	75.0	0.1	6 846	79.0	6.2
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 148 919	72.7	1 045.3	22 878	66.8	20.8	154 850	64.4	140.9	2 845	61.2	2.6	92 439	65.2	84.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.5.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	93 936 399	6.9	245.7	5 876 385	5.5	15.4	50 719 618	6.4	132.6	848 005	5.9	2.2	27 326 623	6.2	71.5
abete rosso	43 943 347	12.9	114.9	1 370 956	10.8	3.6	12 216 432	11.9	31.9	197 124	11.0	0.5	6 171 271	11.8	16.1
cembro	18 713 421	16.9	48.9	969 624	18.5	2.5	7 419 846	19.6	19.4	95 641	18.7	0.3	3 575 689	19.5	9.4
faggio	9 716 988	34.5	25.4	182 329	29.5	0.5	1 602 477	31.5	4.2	24 425	32.1	0.1	1 275 327	31.4	3.3
pino silvestre	2 809 325	35.7	7.3	135 557	27.2	0.4	1 067 412	26.5	2.8	25 447	31.9	0.1	592 596	26.6	1.5
abete bianco	5 822 019	38.1	15.2	108 030	39.5	0.3	866 699	42.6	2.3	12 483	38.9	0.0	476 672	41.7	1.2
betulla	7 231 784	46.0	18.9	140 169	49.1	0.4	854 645	49.2	2.2	15 450	50.0	0.0	527 202	47.9	1.4
castagno	3 412 344	77.5	8.9	36 666	69.4	0.1	284 893	71.3	0.7	8 716	76.9	0.0	182 669	70.8	0.5
nocciolo	10 513 008	92.2	27.5	43 652	94.6	0.1	184 252	94.3	0.5	7 228	98.2	0.0	150 787	95.4	0.4
salicone	1 824 409	46.4	4.8	17 264	39.1	0.0	99 777	45.0	0.3	3 306	53.5	0.0	72 860	40.6	0.2
pioppo tremulo	650 264	100.0	1.7	14 210	100.0	0.0	82 494	100.0	0.2	2 617	100.0	0.0	54 512	100.0	0.1
acero di monte	848 200	46.2	2.2	10 017	54.3	0.0	66 298	59.3	0.2	2 246	80.3	0.0	51 602	56.6	0.1
roverella	358 241	50.3	0.9	9 919	55.7	0.0	65 377	56.7	0.2	868	47.0	0.0	55 507	56.0	0.1
ontano nero	3 417 356	100.0	8.9	9 693	100.0	0.0	24 161	100.0	0.1	579	100.0	0.0	14 853	100.0	0.0
orniello	241 309	100.0	0.6	3 584	100.0	0.0	23 244	100.0	0.1	950	100.0	0.0	20 135	100.0	0.1
carpino nero	624 679	90.9	1.6	4 417	85.2	0.0	23 185	82.1	0.1	332	86.5	0.0	20 770	83.2	0.1
ciliegio selvatico	175 218	84.6	0.5	3 754	85.4	0.0	23 050	88.4	0.1	467	89.4	0.0	15 000	86.9	0.0
frassino maggiore	499 613	76.7	1.3	2 432	53.3	0.0	17 882	54.9	0.0	199	52.2	0.0	16 207	54.5	0.0
rovere	61 930	100.0	0.2	1 188	100.0	0.0	6 542	100.0	0.0	209	100.0	0.0	5 318	100.0	0.0
altre specie	70 397 786	27.9	184.1	313 695	23.3	0.8	1 282 706	22.8	3.4	36 635	27.0	0.1	954 890	20.2	2.5
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	275 197 640	9.1	719.7	9 253 541	4.8	24.2	76 930 988	5.6	201.2	1 282 925	5.3	3.4	41 560 488	5.4	108.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.