

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.1 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	32 465 017	6.6	38.7	6.5	796 074	19.0	27.9	16.4	86 717	46.5	37.5	22.6	33 347 807	6.5	38.3	6.4
Valle d'Aosta	1 989 265	19.3	20.2	19.0	0	-	0	-	2 200	100.0	20	-	1 991 465	19.3	20.2	19.0
Lombardia	25 322 541	7.3	43.8	7.1	1 309 980	29.5	48.8	28.5	37 494	63.0	35	7.0	26 670 015	7.0	44.0	6.9
Alto Adige	8 434 631	12.4	25.4	12.3	0	-	0	-	106 561	49.5	25.0	41.1	8 541 192	12.2	25.4	12.1
Trentino	15 716 268	8.5	42.2	8.4	0	-	0	-	135 441	43.5	53.7	21.6	15 851 709	8.4	42.2	8.3
Veneto	13 612 145	10.2	34.4	10.0	70 646	43.5	33.8	19.6	14 493	100.0	42.8	-	13 697 285	10.1	34.4	10.0
Friuli V.G.	11 171 284	10.7	35.3	10.5	694 799	28.7	91.3	23.6	0	-	0	-	11 866 084	10.2	36.6	10.0
Liguria	9 905 265	8.7	29.5	8.5	13 385	100.0	36.5	-	111 977	31.4	32.4	15.0	10 030 628	8.6	29.6	8.4
Emilia Romagna	21 946 569	6.0	39.8	5.9	313 351	25.4	32.2	20.1	44 352	55.8	30.6	23.5	22 304 272	6.0	39.6	5.8
Toscana	35 485 833	6.8	35.2	6.8	179 626	25.0	32.7	10.5	74 024	48.8	28.6	39.7	35 739 484	6.8	35.2	6.7
Umbria	11 541 410	11.6	31.4	11.5	108 417	30.4	32.0	16.0	0	-	0	-	11 649 826	11.5	31.4	11.4
Marche	12 803 645	7.1	44.1	6.9	50 770	58.1	41.8	18.6	0	-	0	-	12 854 414	7.1	44.1	6.9
Lazio	20 834 441	7.4	39.0	7.3	58 252	46.5	34.2	6.4	317 363	35.7	43.6	27.9	21 210 056	7.3	39.0	7.2
Abruzzo	15 804 732	13.3	40.6	13.2	33 453	52.9	29.8	20.3	43 064	55.0	35.7	5.6	15 881 249	13.2	40.6	13.1
Molise	7 002 920	12.5	53.3	12.2	32 503	52.2	36.5	7.9	12 112	69.6	48.4	13.4	7 047 535	12.5	53.2	12.1
Campania	22 836 276	9.8	60.1	9.6	33 589	47.6	29.1	13.4	144 490	43.8	44.6	28.7	23 014 354	9.7	59.9	9.5
Puglia	8 508 163	14.4	59.5	14.0	49 079	64.5	56.0	14.0	80 491	42.0	41.0	5.6	8 637 733	14.2	59.2	13.8
Basilicata	12 396 784	18.0	48.1	17.9	85 204	62.2	45.7	43.3	84 087	36.7	25.9	15.5	12 566 075	17.8	47.8	17.6
Calabria	22 784 532	6.4	49.8	6.2	134 177	48.9	50.8	32.7	156 316	36.9	20.5	30.2	23 075 025	6.3	49.3	6.1
Sicilia	14 148 753	7.9	55.8	7.4	36 256	64.8	31.9	29.5	50 736	58.1	34.8	28.1	14 235 744	7.9	55.5	7.4
Sardegna	17 535 865	7.5	32.0	7.3	583 353	18.4	22.8	15.1	363 966	25.4	38.0	16.2	18 483 184	7.2	31.7	6.9
Italia	342 246 339	2.1	39.9	2.0	4 582 914	10.8	37.5	9.9	1 865 885	11.3	34.6	7.9	348 695 137	2.0	39.8	2.0

Categorie inventariali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 921 075	24.7	35.8	-	915 960	35.8	49.3	-	479 589	21.4	33.9	-
Valle d'Aosta	866 979	38.5	19.5	-	296 411	45.0	16.3	-	49 389	65.4	42.7	-
Lombardia	1 711 463	18.4	35.9	-	4 222 192	13.2	47.8	-	334 007	35.8	41.7	-
Alto Adige	1 505 698	41.4	16.4	-	5 845 179	14.2	33.4	-	120 141	43.5	45.4	-
Trentino	2 864 092	20.5	45.4	-	3 965 285	14.8	28.9	-	433 877	42.5	27.4	-
Veneto	2 039 769	18.6	49.9	-	4 447 111	17.7	46.0	-	266 702	52.0	37.6	-
Friuli V.G.	440 324	26.3	37.0	-	1 546 153	12.1	34.4	-	35 311	55.4	19.0	-
Liguria	23 087	58.7	21.0	-	10 042	100.0	27.4	-	130 345	39.9	44.5	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	234 372	34.1	57.9	-	115 560	37.8	39.3	-
Toscana	0	-	0	-	45 729	51.5	31.6	-	146 245	33.8	33.7	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	18 220	100.0	49.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	27 192	100.0	73.8	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	11 058	100.0	30.6	-	38 888	70.9	53.7	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	85 298	63.1	72.8	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	36 924	70.7	49.5	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	431 104	32.8	88.9	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	12 372 487	10.3	32.4	9.8	21 584 904	6.8	36.8	6.4	2 703 381	12.5	39.5	10.0

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	932 386	38.5	42.4	-	65 816	42.7	23.3	-	7 458	70.8	9.2	-
Valle d'Aosta	176 764	50.4	14.3	-	991	100.0	2.6	-	0	-	0	-
Lombardia	890 281	30.7	49.3	-	172 731	32.9	35.6	-	0	-	0	-
Alto Adige	244 488	56.7	6.5	-	11 031	100.0	29.2	-	0	-	0	-
Trentino	811 179	23.7	38.2	-	332 525	39.0	54.3	-	0	-	0	-
Veneto	485 146	28.2	37.4	-	202 814	48.3	57.9	-	106 571	78.4	142.7	-
Friuli V.G.	790 236	27.2	78.8	-	1 393 714	44.8	45.2	-	124 642	74.1	111.8	-
Liguria	352 978	33.0	34.4	-	173 943	36.1	31.7	-	704 596	35.4	30.1	-
Emilia Romagna	123 766	31.8	30.6	-	588 043	42.6	35.5	-	105 093	40.2	35.7	-
Toscana	27 576	57.8	25.4	-	500 005	34.2	27.1	-	1 329 777	42.0	29.7	-
Umbria	29 596	76.0	40.1	-	127 363	39.3	21.6	-	158 444	30.9	18.7	-
Marche	0	-	0	-	347 173	20.1	33.4	-	55 139	54.1	37.1	-
Lazio	0	-	0	-	351 031	27.4	41.4	-	201 953	34.2	27.5	-
Abruzzo	42 402	76.3	39.1	-	721 693	15.6	37.7	-	74 024	54.8	29.2	-
Molise	0	-	0	-	94 868	48.1	40.5	-	27 852	70.6	35.7	-
Campania	0	-	0	-	343 970	29.6	54.9	-	191 236	33.4	24.7	-
Puglia	0	-	0	-	74 714	55.7	48.1	-	1 458 181	35.9	50.3	-
Basilicata	0	-	0	-	58 095	48.3	22.3	-	434 394	23.9	46.7	-
Calabria	0	-	0	-	3 905 602	18.2	52.3	-	873 454	59.0	57.1	-
Sicilia	0	-	0	-	313 794	39.1	43.8	-	2 841 343	24.1	69.0	-
Sardegna	0	-	0	-	343 165	25.6	40.0	-	1 429 788	22.1	49.1	-
Italia	4 906 799	12.1	32.4	10.9	10 123 081	10.3	42.8	9.6	10 123 945	12.2	44.8	11.5

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	153 956	45.3	23.8	-	4 510 584	23.4	39.1	-	3 340 785	29.6	47.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	15 125	60.1	13.1	-	96 468	44.0	22.8	-
Lombardia	51 561	51.5	29.2	-	1 757 105	28.9	26.8	-	1 583 516	31.7	37.3	-
Alto Adige	10 900	100.0	28.8	-	150 659	36.7	39.9	-	139 687	31.0	30.8	-
Trentino	0	-	0	-	3 297 417	25.8	53.0	-	137 833	44.0	23.9	-
Veneto	0	-	0	-	1 980 956	39.1	29.5	-	601 296	31.7	41.3	-
Friuli V.G.	47 995	57.7	43.1	-	1 950 022	38.9	22.0	-	158 883	47.7	21.4	-
Liguria	19 850	74.2	27.1	-	1 303 739	26.9	35.2	-	912 391	15.5	21.5	-
Emilia Romagna	141 597	39.6	48.1	-	3 954 235	18.3	39.2	-	2 927 263	8.9	39.2	-
Toscana	290 607	57.0	26.0	-	2 647 890	21.7	36.6	-	5 493 843	24.3	36.5	-
Umbria	53 908	46.4	29.3	-	500 296	29.7	33.1	-	3 523 840	32.7	36.5	-
Marche	148 005	43.6	33.2	-	777 004	26.5	43.6	-	1 907 623	15.5	30.0	-
Lazio	44 652	66.8	30.3	-	5 262 560	16.6	73.4	-	2 909 538	21.8	36.5	-
Abruzzo	72 870	53.8	50.3	-	5 477 143	30.4	44.8	-	2 973 673	18.3	36.4	-
Molise	0	-	0	-	1 181 273	24.5	79.6	-	1 543 675	27.0	38.9	-
Campania	29 107	68.0	26.4	-	6 058 139	9.6	109.8	-	3 118 159	54.2	56.8	-
Puglia	21 405	70.7	27.6	-	402 168	31.3	86.3	-	1 580 990	29.8	60.2	-
Basilicata	112 274	51.7	50.2	-	1 556 123	30.1	58.8	-	1 155 826	32.2	31.3	-
Calabria	342 369	32.9	41.7	-	6 610 662	15.3	85.6	-	1 291 664	11.5	27.7	-
Sicilia	438 667	39.0	72.3	-	603 618	44.8	39.8	-	4 529 949	15.7	73.0	-
Sardegna	226 550	40.7	20.2	-	0	-	0	-	2 547 963	23.6	32.1	-
Italia	2 206 272	14.3	34.8	12.0	49 996 719	6.2	48.3	5.9	42 474 865	7.3	39.2	7.1

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	199 006	22.5	24.6	-	8 048 831	14.9	47.6	-	545 854	16.8	30.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	73 465	79.3	19.1	-	0	-	0	-
Lombardia	101 374	48.7	46.0	-	4 245 400	21.0	51.2	-	4 180 000	23.8	51.5	-
Alto Adige	0	-	0	-	47 408	50.1	31.4	-	158 467	42.8	18.0	-
Trentino	0	-	0	-	62 819	55.9	34.9	-	3 003 831	20.9	73.6	-
Veneto	8 992	100.0	24.1	-	639 153	15.8	34.9	-	1 216 934	48.3	14.7	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	630 238	22.6	47.1	-	1 131 382	41.6	24.7	-
Liguria	305 683	28.2	27.8	-	3 012 036	12.0	27.3	-	1 584 591	15.8	35.4	-
Emilia Romagna	4 033 758	22.6	40.5	-	1 672 124	16.0	39.9	-	4 552 660	10.9	43.4	-
Toscana	7 986 283	10.1	32.0	-	4 860 929	19.8	31.0	-	1 824 253	35.7	29.2	-
Umbria	3 890 546	14.6	32.2	-	62 874	42.1	24.4	-	1 440 420	18.3	24.3	-
Marche	998 172	42.6	36.3	-	98 324	35.4	29.4	-	5 017 686	10.6	65.2	-
Lazio	4 173 423	14.1	34.0	-	1 855 041	34.4	53.0	-	2 408 831	25.2	25.1	-
Abruzzo	2 306 406	42.4	75.0	-	136 576	28.8	27.0	-	1 705 108	27.0	37.0	-
Molise	2 896 015	25.4	61.3	-	9 523	100.0	24.4	-	515 798	26.0	55.1	-
Campania	1 655 632	28.6	24.3	-	2 539 065	13.0	47.7	-	3 421 773	27.8	63.6	-
Puglia	2 239 665	42.0	60.1	-	54 705	58.6	47.0	-	464 373	46.8	92.0	-
Basilicata	6 284 793	30.7	53.2	-	251 468	37.7	37.5	-	509 967	23.6	65.1	-
Calabria	1 211 285	13.2	28.2	-	2 512 317	17.2	36.2	-	131 823	63.8	23.6	-
Sicilia	843 116	23.8	34.8	-	793 249	42.0	83.7	-	116 330	39.7	40.3	-
Sardegna	0	-	0	-	112 556	51.3	50.3	-	0	-	0	-
Italia	39 134 150	7.6	38.7	7.4	31 718 101	6.5	40.2	6.1	33 930 081	6.3	39.8	6.0

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	886 408	15.3	37.7	-	9 457 310	8.0	32.7	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	27 412	100.0	71.1	-	386 260	26.2	32.0	-	0	0.0	0	-
Lombardia	1 037 911	27.8	51.2	-	4 992 262	17.7	43.8	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	112 134	46.0	42.4	-	88 840	38.7	28.2	-	0	0.0	0	-
Trentino	152 465	40.8	47.0	-	645 166	17.8	42.6	-	9 780	100.0	27.1	-
Veneto	312 310	26.2	31.0	-	1 269 563	34.5	34.0	-	34 829	64.8	11.7	-
Friuli V.G.	732 360	37.2	56.6	-	2 190 024	15.5	47.6	-	0	0.0	0	-
Liguria	114 824	31.3	28.5	-	924 301	64.7	33.6	-	332 858	23.0	23.9	-
Emilia Romagna	729 415	23.8	29.6	-	2 736 841	10.7	38.4	-	31 843	71.1	43.3	-
Toscana	1 017 363	23.8	41.4	-	3 533 611	13.9	46.4	-	5 207 735	21.2	41.3	-
Umbria	378 458	30.6	48.9	-	494 150	23.7	53.6	-	881 514	35.3	22.1	-
Marche	837 948	60.2	60.9	-	2 520 791	11.1	39.4	-	77 559	49.7	11.6	-
Lazio	321 045	24.9	34.9	-	1 983 773	18.2	39.9	-	1 094 203	29.4	22.8	-
Abruzzo	793 991	19.4	39.2	-	1 158 883	40.7	23.8	-	292 018	54.3	33.6	-
Molise	238 487	28.9	33.9	-	356 002	31.8	48.0	-	54 129	61.9	46.2	-
Campania	591 166	19.1	50.2	-	2 293 839	36.3	76.0	-	2 566 662	10.0	69.2	-
Puglia	17 935	100.0	46.2	-	714 927	24.7	61.4	-	1 303 011	24.7	78.0	-
Basilicata	304 675	25.4	22.1	-	1 222 758	78.5	55.7	-	388 369	36.6	43.4	-
Calabria	326 343	35.2	38.0	-	2 213 957	18.5	61.6	-	2 304 736	10.6	52.8	-
Sicilia	178 517	28.7	27.7	-	798 979	26.7	51.5	-	933 105	19.1	51.3	-
Sardegna	101 959	44.8	27.3	-	370 163	25.7	43.2	-	6 796 710	12.4	27.5	-
Italia	9 213 125	8.5	40.2	7.5	40 352 399	5.4	40.6	5.0	22 309 061	7.0	36.0	6.6

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	32 465 017	6.6	38.7	6.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 989 265	19.3	20.2	19.0
Lombardia	0	-	0	-	42 738	71.8	48.5	-	25 322 541	7.3	43.8	7.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	8 434 631	12.4	25.4	12.3
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	15 716 268	8.5	42.2	8.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	13 612 145	10.2	34.4	10.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	11 171 284	10.7	35.3	10.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	9 905 265	8.7	29.5	8.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	21 946 569	6.0	39.8	5.9
Toscana	520 746	66.5	84.8	-	53 242	81.7	36.8	-	35 485 833	6.8	35.2	6.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	11 541 410	11.6	31.4	11.5
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	12 803 645	7.1	44.1	6.9
Lazio	113 252	44.9	51.2	-	87 947	52.7	34.1	-	20 834 441	7.4	39.0	7.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	15 804 732	13.3	40.6	13.2
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	7 002 920	12.5	53.3	12.2
Campania	12 885	100.0	35.0	-	14 642	100.0	39.8	-	22 836 276	9.8	60.1	9.6
Puglia	0	-	0	-	176 089	64.9	20.6	-	8 508 163	14.4	59.5	14.0
Basilicata	0	-	0	-	81 116	41.7	36.3	-	12 396 784	18.0	48.1	17.9
Calabria	193 374	42.6	39.9	-	435 841	21.4	21.6	-	22 784 532	6.4	49.8	6.2
Sicilia	457 197	23.2	29.4	-	1 300 887	14.2	43.6	-	14 148 753	7.9	55.8	7.4
Sardegna	4 841 264	15.7	34.7	-	765 746	16.5	41.0	-	17 535 865	7.5	32.0	7.3
Italia	6 138 719	13.8	36.4	13.0	2 958 248	9.5	34.9	6.8	342 246 339	2.1	39.9	2.0

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.4.3 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale profondo del suolo per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	568 725	24.5	25.7	-	149 088	32.7	30.9	-	78 261	51.9	50.3	-	796 074	19.0	27.9	16.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 168 675	33.0	49.3	-	108 060	37.5	40.1	-	33 246	100.0	75.4	-	1 309 980	29.5	48.8	28.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	59 682	49.1	34.2	-	10 964	100.0	31.9	-	0	-	0	-	70 646	43.5	33.8	19.6
Friuli V.G.	598 108	33.1	102.9	-	85 857	50.5	60.3	-	10 834	100.0	29.2	-	694 799	28.7	91.3	23.6
Liguria	13 385	100.0	36.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 385	100.0	36.5	-
Emilia Romagna	262 358	29.3	33.0	-	35 206	53.1	24.7	-	15 787	100.0	42.9	-	313 351	25.4	32.2	20.1
Toscana	51 350	52.6	27.9	-	79 420	39.3	36.1	-	48 857	51.1	33.7	-	179 626	25.0	32.7	10.5
Umbria	4 769	100.0	12.9	-	103 648	31.4	34.3	-	0	-	0	-	108 417	30.4	32.0	16.0
Marche	12 444	100.0	33.5	-	38 325	69.7	45.5	-	0	-	0	-	50 770	58.1	41.8	18.6
Lazio	14 934	100.0	40.5	-	43 317	52.2	32.4	-	0	-	0	-	58 252	46.5	34.2	6.4
Abruzzo	6 132	100.0	16.9	-	27 321	60.8	35.9	-	0	-	0	-	33 453	52.9	29.8	20.3
Molise	19 102	80.7	38.9	-	13 401	52.8	33.5	-	0	-	0	-	32 503	52.2	36.5	7.9
Campania	15 037	60.5	35.9	-	18 552	71.0	25.2	-	0	-	0	-	33 589	47.6	29.1	13.4
Puglia	0	-	0	-	22 814	77.7	46.7	-	26 265	100.0	67.6	-	49 079	64.5	56.0	14.0
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	85 204	62.2	45.7	-	85 204	62.2	45.7	43.3
Calabria	12 380	58.2	41	-	27 434	62.7	32.4	-	94 363	66.6	63.2	-	134 177	48.9	50.8	32.7
Sicilia	0	-	0	-	36 256	64.8	31.9	-	0	-	0	-	36 256	64.8	31.9	29.5
Sardegna	0	-	0	-	417 610	23.0	22.6	-	165 743	30.4	23.5	-	583 353	18.4	22.8	15.1
Italia	2 807 081	16.6	42.4	15.6	1 217 274	11.8	29.7	7.9	558 559	21.0	37.2	13.7	4 582 914	10.8	37.5	9.9

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale profondo (10-30 cm)